

Obstgehölze Vorratsliste

Zwischenverkauf vorbehalten

Steinobst

Sorte	Beschreibung
Bühler Frühzwetsche	mittelgroß, grünlich gelbes Fruchtfleisch, saftig, Fruchtfleisch manchmal schlecht vom Stein lösend, süß-säuerlich, nicht alle Früchte reifen gleichzeitig, regelmäßiger Schnitt erforderlich, sonst Alternanz, Reifezeit August
Cacaks Schöne	Erntezeit Ende August, Frucht groß, dunkelblau, Fruchtfleisch fest, Saftgehalt hoch, Steine lösen gut vom Fruchtfleisch, geschützter, warmer Standort notwendig, wenig anfällig gegen Scharka-Krankheit
Ersinger Frühzwetsche	Erntezeit Ende August, mittelgroße Frucht, dunkelviolett, Früchte sind wenig transportfähig, Saftgehalt mittel, bei Regen können die Früchte platzen
Hanita	Erntezeit Anfang September, mittelgroß, dunkelblau, gelbgrünes Fruchtfleisch, saftig, guter Geschmack, Frischverzehr oder Verarbeitung möglich, wenig anfällig gegen Scharka-Krankheit
Hauszwetsche	Erntezeit von Anfang September bis Ende Oktober Starke Verbreitung im Mittelalter, dunkelblau bis violett, Fruchtfleisch grüngelb bis goldgelb, fest süß-säuerlich, würzig, scharkaanfällig

Italienische Zwetsche	Reifezeit September, mittelgroß, dunkel- bis schwarzblau, Fruchtfleisch saftig, süß-säuerlich, kräftiger Geschmack, alle Arten der Verwendung möglich, sehr scharkaanfällig
Königin Victoria	große Frucht, von rotgelb bis hellviolett, sehr saftig, sehr würzig, Stein löst nur schwer vom Fruchtfleisch, monilia- und scharkaanfällig, Reifezeit: Anfang-Mitte September
Ontariopflaume	große Frucht, gelbliche Farbe, festes Fruchtfleisch, süß aber wenig würzig, Reifezeit Mitte August
Ortenauer	große Frucht, dunkelblaue und zähe Haut, Fruchtfleisch grüngelb, saftig, wenig Geschmack, Reifezeit Ende August, anfällig gegen Scharka und Monilia
President	Reifezeit Oktober, sehr groß, dunkelviolett, sehr groß, sehr süß, saftig, Früchte können unreif geerntet werden, reifen nach, in feuchten Jahren monilia-gefährdet
Ruth Gerstetter	Reifezeit September, Haut bläulich, Fruchtfleisch grüngelb, saftig, wenig Würze
The Czar	Reifezeit August, mittelgroße Frucht, dunkelviolett, glasig gelbliches Fruchtfleisch, saftig, süß, würzig, gefährdet gegen Scharka-Krankheit und Pflaumensägewespe
Wangenheimer Frühwetsche	Reifezeit Ende August bis Mitte September, mittelgroß, schwarzblaue Haut, sehr süß, saftig, würzig, Stein löst gut vom Fruchtfleisch, scharkagefährdet

Graf Althans	Reifezeit Ende August bis Mitte September, große, runde Frucht, bläulichrot, Fruchtfleisch goldgelb, saftig und aromatisch, süß mit einer feinen Säure, jede Verwendung möglich, moniliagefährdet
Große Grüne Reneklode	klein bis mittelgroß, gelbgrün, saftig, sehr süß, Ernte mitte August bis Mitte September, alle Verwendungsmöglichkeiten
Oullins Reneklode	Reifezeit ab Mitte August, sehr große Frucht, rund, Fruchtfleisch hellgrün, fest, süß, ohne besonderes Aroma, alle Verwendungsmöglichkeiten, anfällig für Fruchtmonilia
Mirabelle von Nancy	Erntezeit Mitte bis Ende August, kleine bis mittelgroße Frucht, tiefgelb, sehr süß, aromatisch, reife Früchte platzen bei Nässe